AMAB

ACUPUNTURA PARA MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA

Recomendações em Acupuntura Fibromialgia

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

Sumário

1. Definição da condição e contextualização da condição na Atenção Primária à Saúde (APS)	3
2. Quando oferecer Acupuntura para o paciente com a condição?	3
3. O que esperar da Acupuntura para a condição e como avaliar sua resposta?	4
4. Recomendações em Acupuntura para Fibromialgia	7
4.1 Princípio de Seleção de Pontos pela Medicina Tradicional Chinesa (MTC) – Fibromialgia	8
4.2 Princípio de Seleção de Pontos pela Acupuntura Médica Ocidental (WMA) – Fibromialgia	8
4.3 Resumo dos Princípios de Seleção de Pontos e localização dos Pontos selecionados – Fibromialgia.....	9
5. Referências Bibliográficas	11

1. Definição da condição e contextualização da condição na Atenção Primária à Saúde (APS)

A fibromialgia é uma condição complexa caracterizada por um espectro de gravidade com ampla variação entre as pessoas acometidas¹. Mesmo um paciente em particular pode apresentar flutuações clínicas significativas ao longo do tempo^{1,2}. Seu diagnóstico baseia-se na presença de dor crônica generalizada com duração acima de 3 meses, acompanhada por uma miríade de sintomas, incluindo fadiga, distúrbios do sono, transtornos cognitivos e de humor e outras queixas somáticas, em geral pouco específicas, cada uma em graus variados^{3,4}.

A avaliação clínica de pacientes com a condição engloba detalhes do histórico do paciente e exame físico, com especial foco na exclusão de condições específicas mais graves, sejam elas neurológicas, reumáticas ou de outra natureza^{1,2,5}. Ao contrário do que acontecia no passado, a presença de pontos dolorosos (*tender points*) já não é necessário para a confirmação diagnóstica ou para a avaliação da gravidade^{3,4}.

Os médicos da Atenção Primária desempenham um papel fundamental no manejo do paciente, e o encaminhamento e confirmação diagnóstica por especialistas fica reservado para casos que apresentem sintomas atípicos ou condições comórbidas específicas². Embora tratamentos farmacológicos possam oferecer alívio modesto para muitos dos pacientes, o cuidado eficaz da pessoa com fibromialgia requer estratégias baseadas em sintomas, priorizando intervenções não farmacológicas que promovam hábitos de vida saudáveis e envolvimento ativo do paciente^{1,2,5-7}.

2. Quando oferecer Acupuntura para o paciente com a condição?

Os consensos terapêuticos internacionais apresentam inconsistências em relação à recomendação de estratégias terapêuticas relacionadas à fibromialgia, mesmo que a maioria descreva exercícios aeróbicos, terapia cognitivo comportamental, estratégias de atenção plena (*mindfulness*), amitriptilina e tratamento multimodal como opções de primeira linha⁸.

Em relação à Acupuntura, essa inconsistência se mantém. A ausência de estudos clínicos é citada como uma barreira para a formulação de uma recomendação contra ou a favor, como aponta a diretriz canadense de 2012⁵. Em um consenso internacional multidisciplinar⁶, a Acupuntura não foi recomendada. Esses autores citam que, embora a Acupuntura tenha apresentado resultados significativos a favor de sua recomendação, a sua disponibilidade e os fatores culturais podem ter influenciado a escolha do painel de consenso⁶.

A diretriz da *European Alliance of Associations for Rheumatology* (EULAR) recomenda a prática gradual de atividade física com ou sem outros tratamentos não farmacológicos, como a Acupuntura, para todos os pacientes com fibromialgia. Para este grupo, a Acupuntura é considerada como tratamento de segunda linha, a ser indicada após implementação das medidas de primeira linha, seguindo uma avaliação baseada em sintomas e centrada na pessoa⁷. Desta forma, ao considerar a indicação do tratamento com Acupuntura para fibromialgia, deve-se levar em conta critérios como aceitação da terapia, acesso à modalidade e experiência do médico⁹.

Lembre-se que a Acupuntura demonstra efeitos positivos para diversas condições dolorosas crônicas frequentes, como dor musculoesquelética inespecífica, lombalgia, osteoartrite, cefaleia crônica e dor em ombro^{10,11}. Estas condições comórbidas são comuns em pacientes com diagnóstico de fibromialgia e seu tratamento pode auxiliar na implementação de estratégias de manejo de primeira linha para a condição.

3. O que esperar da Acupuntura para a condição e como avaliar sua resposta?

Revisões sistemáticas sugerem que a Acupuntura possui efeitos clínicos para redução da intensidade da dor e da fadiga, além de contribuir com a qualidade do sono, funcionalidade e sensação de bem-estar geral, quando comparada ao tratamento *sham*¹²⁻¹⁴ e, em alguns estudos, quando comparada a medicações adjuvantes (p.ex. amitriptilina)¹³.

Na prática clínica, uma pergunta simples que avalie a impressão global de mudança do paciente com o uso da escala *Likert* de 7 pontos (1 muito pior, 2 moderadamente pior, 3 um pouco pior, 4 igual, 5 um pouco melhor, 6 moderadamente melhor, 7 muito melhor) permite uma fácil avaliação do estado geral da pessoa com fibromialgia⁵. Essa escala de 7 pontos também pode ser aplicada especificamente para monitorar sintomas individuais⁵, como aqueles listados a seguir na Tabela 1.

Tabela 1 – Sugestões de domínios e atividades que podem ser selecionadas para monitoramento da evolução do paciente ao longo do tratamento da fibromialgia com Acupuntura.

Domínio	Pergunta avaliativa*
Dor	O quão ruim tem sido sua dor? O quanto a dor interfere em sua habilidade de realizar seu trabalho (p.ex. atividade doméstica, profissão, etc)
Fadiga	O quão cansado(a) você tem se sentido?
Sono	O quão cansado(a) você se sente ao acordar pela manhã?
Saúde mental	O quão ansioso(a) você se sentiu na última semana? O quão triste você se sentiu na última semana?
Comentários	Eu estou resfriado

*Adaptado do instrumento FASFIQ *Brief Symptom Scale* desenvolvido por Boomershine, et. al (2011)¹⁵.

De forma geral, os parâmetros de melhora utilizados como medidas de desfecho são a intensidade da dor e de outros sintomas com base na escala visual análoga (EVA) (Tabela 2). Nos estudos clínicos, o efeito do tratamento com Acupuntura parece oferecer um resultado positivo, ao menos no curto prazo¹²⁻¹⁴. Isso reforça a utilização da Acupuntura como ponte para outros tratamentos ativos e como oportunidade para oferecer orientações de educação do paciente e de fomento à autoeficácia.

Tabela 2 – Resumo dos principais resultados e características de estudos clínicos em Acupuntura para fibromialgia.

Estudo	Tipo de estudo	Perfil clínico, contexto e duração do tratamento	Desfechos primários avaliados	Resultados	Duração mínima do efeito
Ugurlu, et al ¹⁶	Explanatório	Pacientes com fibromialgia pelos critérios da ACR 1990* com média de 47 anos; Atenção Secundária; 12 sessões em 8 semanas	Intensidade de sintomas (EVA**)	Total de 50 pacientes; Ambos os grupos Acupuntura verdadeira e sham mostraram melhora nos parâmetros ao final do tratamento. O grupo Acupuntura verdadeira demonstrou melhores escores do que o grupo sham em relação a todos os escores de VAS	Final do tratamento
Vas, et al ¹⁷	Explanatório	Pacientes com fibromialgia pelos critérios da ACR 1990* com média de 53 anos; Atenção Primária; 9 sessões em 9 semanas	Intensidade de dor (EVA**)	Total de 164 pacientes; Acupuntura foi superior ao tratamento sham (-20,3 vs -6,0 no VAS**)	6 meses
Assefi, et al ¹⁸	Explanatório	Pacientes com fibromialgia pelos critérios da ACR 1990* com média de 46 anos; 24 sessões em 12 semanas	Intensidade de sintomas (EVA**)	Total de 100 pacientes; não houve diferença entre os 4 grupos que receberam diferentes modalidades de Acupuntura	---
Targino, et al ¹⁹	Pragmático	Pacientes com fibromialgia pelos critérios da ACR 1990* com média de 52 anos; 20 sessões em 10 semanas	Intensidade de dor (EVA**)	Total de 58 pacientes; A Acupuntura em conjunto com o tratamento usual foi superior ao tratamento usual isoladamente	Final do tratamento

*ACR: American College of Rheumatology

**EVA: escala visual análoga

4. Recomendações em Acupuntura para Fibromialgia

Posicionamento	Decúbito dorsal ou lateral. Dê preferência à posição que forneça o maior conforto ao paciente naquele dia.
Pontos principais	<p>Decúbito dorsal: LI4, LR3, PC6, ST36, SP6</p> <p>Decúbito lateral: LI4, LR3, PC6, SP6, ST36, GB34, KI3, BL23.</p>
Número de sessões	8 a 12 sessões de 20 minutos.
Sugestões de ações adicionais à Acupuntura²⁵	<p>O manejo do paciente deve ser centrado na Atenção Primária, com encaminhamento especializado limitado a pacientes selecionados que apresentem sintomas atípicos ou condições comórbidas específicas. A confirmação do diagnóstico por especialistas não é mais necessária.</p> <p>O cuidado ideal é baseado em sintomas e deve-se escolher o problema principal em conjunto com o paciente. Sempre incluir estratégias não farmacológicas que promovam hábitos de vida saudáveis com foco na participação ativa do paciente.</p> <p>Novos sintomas que se apresentam em um paciente com fibromialgia estabelecida devem ser avaliados de acordo com a boa prática médica, com cautela para evitar investigação excessiva, que pode levar à medicalização desnecessária.</p> <p>Tratamentos farmacológicos provavelmente serão necessários para a maioria dos pacientes, mas pode-se esperar que proporcionem apenas um alívio modesto dos sintomas.</p> <p>Os tratamentos farmacológicos devem ser usados de acordo com o método “start low, go slow” (comece com dose baixa e vá devagar), com avaliação regular da eficácia e efeitos colaterais, alguns dos quais podem mimetizar os sintomas da fibromialgia.</p>

4.1 Princípio de Seleção de Pontos pela Medicina Tradicional Chinesa (MTC) – Fibromialgia

Em geral, o paciente procura o tratamento em virtude da queixa de dor em uma ou mais áreas do corpo. Desta forma, o Princípio de Seleção de Pontos (PSP) básico é a escolha de Pontos de acordo com a região em que o paciente está referindo dor. Se a dor for posterior, utilizaremos Pontos do Eixo *Tai Yang* (Meridianos Intestino Delgado/SI e Bexiga/BL) e Pontos do Meridiano *Du Mai* (GV20). Se a dor localizar-se no eixo lateral, utilizaremos Pontos de *Shao Yang* (Meridianos Triplo Aquecedor/TE e Vesícula Biliar/GB). E se a queixa for anterior, utilizaremos Pontos do Eixo *Yang Ming* (Meridianos Intestino Grosso/LI e Estômago/ST).

O conjunto de sintomas pode variar e, muitas vezes, direcionar a prescrição para uma desarmonia de Substâncias Fundamentais, *Yin-Yang* ou sistema *Zang-Fu* específica. Assim, quadros com predomínio de exaustão e fadiga podem direcionar a prescrição ao tratamento da Deficiência de *Qi* (LI11, ST36). Sintomas de Calor podem apontar para uma Deficiência de *Yin* (SP6, CV4, LI11).

Quanto aos *Zang-Fu*, sintomas gástricos e intestinais, associados à inapetência, indicam uma desarmonia de *Pi/Wei* (SP6, ST36). Opressão torácica, palpitação e/ou insônia, de *Xin* (HT7, CV17). Irritabilidade e acometimento de músculos e tendões, de *Gan/Dan* (LR3, GB34). Dor lombar e desconforto em joelhos, de *Shen* (KI3, BL23).

Com base em outros sintomas, ou mesmo sintomas mais agudos, podemos utilizar o PSP de função de Ponto. Eis algumas opções de Pontos de acordo com o sintoma apresentado:

- LI4: Ponto com função analgésica geral;
- LI11: dor em ombro ou joelho;
- PC6: trata náuseas e vômitos;
- GV20: transtornos mentais e de humor;
- EX-HN3 (*Yintang*): insônia e ansiedade.

4.2 Princípio de Seleção de Pontos pela Acupuntura Médica Ocidental (WMA) – Fibromialgia

Sugere-se abordar inicialmente poucos Pontos de efeito geral e, se tolerado, alguns Pontos próximos aos sintomas principais. Conforme a evolução, aumente a dose da Acupuntura ao acrescentar outros Pontos de efeitos geral, segmentar e/ou local.

Em pacientes com fibromialgia, é relativamente comum que se observe dolorimento pós-agulhamento de alguns Pontos. Ou até mesmo um dolorimento generalizado logo após as primeiras sessões. Isso ocorre principalmente após a abordagem direta de pontos-gatilhos miofasciais e pontos sensíveis em áreas de dor. Portanto, nas primeiras sessões é recomendável dar prioridade aos Pontos com efeitos regulatório e segmentar. A abordagem de pontos-gatilho miofasciais pode ser considerada a depender da resposta do paciente às primeiras sessões de tratamento.

Ao mesmo tempo, pacientes com fibromialgia frequentemente apresentam uma ou duas áreas distintas acometidas por dor miofascial, concomitantemente à dor generalizada multisegmentar. Acredita-se que a abordagem da dor miofascial pode não apenas melhorar a dor localizada, mas pode resultar em alguma melhora geral do quadro nociplástico²⁰.

Novamente, o tratamento deve ser cauteloso no início, uma vez que a aderência às sessões será comprometida se a dor pós-agulhamento for intensa. Desta forma, procure explicar ao paciente que o dolorimento pós-agulhamento pode ocorrer, e que sua ocorrência é esperada nas primeiras sessões de tratamento. Também é importante considerar o tratamento de quaisquer comorbidades viscerais, uma vez que a melhora destas reduzirá os sintomas associados à fibromialgia.

4.3 Resumo dos Princípios de Seleção de Pontos e localização dos Pontos selecionados – Fibromialgia

PONTOS PRINCIPAIS			Escaneie ou clique no QR code
Ponto	PSPs MTC	PSPs WMA	Localização Método de Punção
LI4	Meridiano (anterior) Função de Ponto (analgesia)	Efeito geral*
LR3	<i>Zang-Fu</i> (irritabilidade, músculos e tendões)	Efeito geral*
PC6	<i>Zang-Fu</i> (insônia, palpitação, opressão torácica) Função de Ponto (náuseas e vômitos)	Efeito geral*
ST36	Meridiano (anterior) <i>Zang-Fu</i> (sintomas do trato gastrointestinal) Tonificação do Qi	Efeito geral*
SP6	<i>Zang-Fu</i> (inapetência e sintomas do trato gastrointestinal)	Efeito geral*
GB34	Meridiano (lateral) <i>Zang-Fu</i> (irritabilidade) Função de Ponto (músculos e tendões)	Efeito geral*

PONTOS PRINCIPAIS

Escaneie
ou clique no
QR code

Ponto	PSPs MTC	PSPs WMA	Localização Método de Punção
KI3	<i>Zang-Fu</i> (dor lombar e desconforto em joelhos)	Efeito geral*	
BL23	<i>Zang-Fu</i> (dor lombar e desconforto em joelhos)	Efeito geral*	

* de forma geral, os Pontos elencados serão utilizados como Pontos regulatórios de efeito geral, tendo em vista a fisiopatologia da fibromialgia; mas a depender da região de dor, cada um deles pode assumir efeitos segmentares e locais.

PONTOS COMPLEMENTARES

Escaneie
ou clique no
QR code

Ponto	PSPs MTC	PSPs WMA	Localização Método de Punção
GV20	Meridiano (linha média posterior) Função de Ponto (transtornos mentais)	Efeito geral*	
EX-HN3 (<i>Yintang</i>)	Função de Ponto (insônia, ansiedade)	Efeito geral*	
GB20	Meridiano (lateral) <i>Zang-Fu</i> (cefaleia e irritabilidade)	Efeito geral*	

PONTOS COMPLEMENTARES

Escaneie
ou clique no
QR code

Ponto	PSPs MTC	PSPs WMA	Localização Método de Punção
GB21	Meridiano (lateral) <i>Zang-Fu</i> (cefaleia e irritabilidade)	Efeito geral*
LI11	Meridiano (anterior) Tonificação do Qi Função de Ponto (remove Calor; trata dor em ombro e joelho)	Efeito geral*
HT7	<i>Zang-Fu</i> (opressão torácica, palpitação e insônia)	Efeito geral*
CV17	<i>Zang-Fu</i> (opressão torácica, palpitação e insônia)	Efeito geral*
CV4	Função de Ponto (Tonifica o Yin)	Efeito geral*
<i>Ashi</i>	Tratar dor localizada e ponto sensível	Efeito local (pontos-gatilho miofasciais)	Vide mapa de pontos-gatilho no manual de Pontos do AMAB

* de forma geral, os Pontos elencados serão utilizados como Pontos regulatórios de efeito geral, tendo em vista a fisiopatologia da fibromialgia; mas a depender da região de dor, cada um deles pode assumir efeitos segmentares e locais.

5. Referências Bibliográficas.

1. Bair MJ, Krebs EE. Fibromyalgia. *Ann Intern Med* 2020; 172: ITC33.
2. Winslow BT, Vandal C, Dang L. Fibromyalgia: Diagnosis and Management. *Am Fam Physician* 2023; 107: 137–144.
3. Wolfe F, Clauw DJ, Fitzcharles M–A, *et al.* 2016 Revisions to the 2010/2011 fibromyalgia diagnostic criteria. *Semin Arthritis Rheum* 2016; 46: 319–329.
4. Arnold LM, Bennett RM, Crofford LJ, *et al.* AAPT Diagnostic Criteria for Fibromyalgia. *J Pain* 2019; 20: 611–628.
5. Fitzcharles M–A, Ste-Marie PA, Goldenberg DL, *et al.* 2012 Canadian Guidelines for the diagnosis and management of fibromyalgia syndrome: executive summary. *Pain Res Manag* 2013; 18: 119–126.
6. Kundakci B, Hall M, Atzeni F, *et al.* International, multidisciplinary Delphi consensus recommendations on non-pharmacological interventions for fibromyalgia. *Semin Arthritis Rheum* 2022; 57: 152101.
7. Macfarlane GJ, Kronisch C, Dean LE, *et al.* EULAR revised recommendations for the management of fibromyalgia. *Ann Rheum Dis* 2017; 76: 318–328.
8. Thieme K, Mathys M, Turk DC. Evidenced-Based Guidelines on the Treatment of Fibromyalgia Patients: Are They Consistent and If Not, Why Not? Have Effective Psychological Treatments Been Overlooked? *J Pain* 2017; 18: 747–756.
9. Guyatt G, Jaeschke R, Wilson MC, *et al.* What Is Evidence-Based Medicine? In: Guyatt G, Rennie D, Meade MO, *et al.* (eds) *Users' Guides to the Medical Literature: A Manual for Evidence-Based Clinical Practice*, 3rd ed. New York, NY: McGraw-Hill Education, jamaevidence.mhmedical.com/content.aspx?aid=1183875473 (2015, accessed 20 April 2024).
10. Vickers AJ, Cronin AM, Maschino AC, *et al.* Acupuncture for chronic pain: individual patient data meta-analysis. *Arch Intern Med* 2012; 172: 1444–1453.

11. Vickers AJ, Linde K. Acupuncture for chronic pain. *JAMA* 2014; 311: 955–956.
12. Kim J, Kim S-R, Lee H, *et al.* Comparing Verum and Sham Acupuncture in Fibromyalgia Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Evid Based Complement Alternat Med* 2019; 2019: 8757685.
13. Zhang X-C, Chen H, Xu W-T, *et al.* Acupuncture therapy for fibromyalgia: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *J Pain Res* 2019; 12: 527–542.
14. Zheng C, Zhou T. Effect of Acupuncture on Pain, Fatigue, Sleep, Physical Function, Stiffness, Well-Being, and Safety in Fibromyalgia: A Systematic Review and Meta-Analysis. *J Pain Res* 2022; 15: 315–329.
15. Boomershine CS, Emir B, Wang Y, *et al.* Simplifying Fibromyalgia Assessment: The VASFIQ Brief Symptom Scale. *Ther Adv Musculoskelet Dis* 2011; 3: 215–226.
16. Ugurlu FG, Sezer N, Aktekin L, *et al.* The effects of acupuncture versus Sham acupuncture in the treatment of fibromyalgia: a randomized controlled clinical trial. *Acta Reumatol Port* 2017; 42: 32–37.
17. Vas J, Santos-Rey K, Navarro-Pablo R, *et al.* Acupuncture for fibromyalgia in primary care: a randomised controlled trial. *Acupunct Med* 2016; 34: 257–266.
18. Assefi NP, Sherman KJ, Jacobsen C, *et al.* A randomized clinical trial of acupuncture compared with Sham acupuncture in fibromyalgia. *Ann Intern Med* 2005; 143: 10–19.
19. Targino R, Imamura M, Kaziyama H, *et al.* A randomized controlled trial of acupuncture added to usual treatment for fibromyalgia. *J Rehabil Med* 2008; 40: 582–588.
20. White A, Cummings M, Filshie J. *An Introduction to Western Medical Acupuncture*. 2nd ed. edição. Edinburgh ; New York: Elsevier, 2018.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretaria de Atenção Primária à Saúde – SAPS
Departamento de Gestão do Cuidado Integral – DGCI
Núcleo Técnico de Gestão da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no
SUS – NTG PNPIC

Gestores da PNPIC/DGCI/SAPS/MS:

Daniel Miele Amado
Paulo Roberto Sousa Rocha

Equipe Técnica NTG PNPIC:

Erika Cardozo Pereira
Nathalia Oliveira da Silva
Júlia Miller da Fonseca Baldini
Andrea Nazaré Rezende Lemos
Júlio Mariano Kersul de Carvalho

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Reitor – Irineu Manoel de Souza
Vice-Reitora – Joana Célia dos Passos

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Diretor – Fabrício de Souza Neves
Vice-Diretor – Ricardo de Souza Magini

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA

Chefe do Departamento – Rodrigo Otávio Moretti Pires

COMISSÃO GESTORA

Coordenador Geral – Lúcio José Botelho
Coordenador Pedagógico – Li Shih Min
Coordenação Técnica – João Eduardo Marten Teixeira
Coordenação Técnica – Ari Ojeda Ocampo Moré
Secretaria Executiva – Leila Cecília Diesel

PRODUÇÃO DO MATERIAL INSTRUCIONAL

Coordenador de produção – João Eduardo Marten Teixeira
Editor – Breno de Almeida Biagiotti
Diagramação – Breno de Almeida Biagiotti

CONTEUDISTAS

João Eduardo Marten Teixeira
Li Shih Min

REVISOR

Ari Ojeda Ocampo Moré